

# Уход при подозреваемой или действительной экстравазации

Эта информация позволит вам узнать,  
как осуществлять уход при  
подозреваемой или действительной  
экстравазации.



Экстравазацией называется случайное попадание лекарственного препарата из вены в окружающие ткани (подкожно и/или внутрикожно) во время внутривенной манипуляции. Это может вызывать раздражение кожи вплоть до появления волдырей и открытых ран. Такая ситуация может произойти в любом месте, куда Вам поставили внутривенную капельницу.



Вы получили эту памятку, поскольку есть вероятность того, что некоторое количество введенного Вам лекарства проникло в ткани. Чтобы ослабить возможную боль и раздражение, следуйте инструкциям, приведенным на обороте.



## Уход за местом экстравазации



→ Накладывайте на это место \_\_\_\_\_ компресс 4–5 раз в день в течение следующих 48 часов (2 суток). Каждый раз оставляйте компресс на 20 минут. Это поможет уменьшить отек и дискомфорт.



→ В течение следующих 24–48 часов как можно чаще приподымайте затронутый участок, подкладывая под него подушку. Это поможет уменьшить отек и улучшить кровоснабжение участка.



→ Принимайте душ, используя мягкое мыло, и осторожно промакивайте участок насухо. Не погружайте его надолго ни в какие жидкости.



→ Если Ваш врач дал Вам лекарство по поводу экстравазации, принимайте его в соответствии с указаниями врача. Не наносите на затронутый участок другие лосьоны, кремы или мази, за исключением случаев, когда это порекомендовал Ваш врач.



→ Перед выходом на улицу прикрывайте затронутый участок, чтобы защитить его от солнечного света. Солнечный свет может усилить раздражение.



→ Носите свободную одежду. Обтягивающая одежда может вызвать раздражение на затронутом участке. Не трите и не массажируйте область вокруг места экстравазации.

## Позвоните своему врачу (или медсестре), если у вас:

Возникли изменения в месте экстравазации или вокруг него, например: появление или усиление: боли, кожи, отека;

Повреждение кожи возле этого места;

Водяни или жидкие выделения возле этого места;

Онемение, покалывание или изменение ощущений вблизи этого места;

Теплая или горячая на ощупь кожа;

Возникли проблемы с подвижностью затронутого участка, например, вы не можете согнуть руку;

Температура тела 38 °C или выше;

Возникли любые другие вопросы или опасения.

## Последующий уход

1. Если лекарство, проникнувшее в ткани, — это препарат химиотерапии, медсестра/ медбратья позвонит вам на следующий день после того, как произошла экстравазация, чтобы узнать о Вашем самочувствии.
2. Медсестра (медбратья) будет продолжать звонить Вам один раз в неделю в течение следующих \_\_\_\_\_ недель. Вам скажут, как долго нужно будет продолжать уход за местом экстравазации.
3. Важно, чтобы Вы предоставили медсестре (медбратью) номер телефона, по которому можно будет с вами связаться. Если Вы пропустите звонок медсестры (медбрата), перезвоните по номеру \_\_\_\_\_